

PRÉPARATION POUR LA COLOSCOPIE

Votre côlon doit être complètement vide afin d'assurer le succès de l'examen.

Bi-Peglyte

Vous devez vous procurer le produit suivant à la pharmacie de votre choix :

- 1 boîte de Bi-Peglyte, la boîte contient 3 comprimés de Bisacodyl.

Le JOUR AVANT votre examen :

- **Buvez SEULEMENT des liquides clairs toute la journée. Prenez un verre de liquides clair (8 oz) à chaque heure.** (Gatorade, eau, jus, boissons gazeuses, bouillon, thé sans ajout, café noir, Jello jaune/vert/orange sans fruits ou garnitures ajoutées).
- **Ne prenez pas aucun aliment solide. Pas de liquide de couleur foncé/rouge, pas de jus avec pulpe et aucun produit laitier.**
- **Le matin, préparer la solution et la garder au frigo jusqu'à son utilisation.**
- **À 12h00 :** prendre **3 comprimés Bisacodyl** avec 1 verre d'eau (250mL/8oz) et continuer à boire des liquides au besoin pendant la journée ;
- **À 17h00 :** commencez à boire 1L de solution, 1 verre (250mL/8oz) toutes les 10 minutes jusqu'à ce qu'il n'en reste plus.
- Si vous vous sentez trop ballonné, attendez de passer une selle puis continuez à boire.

Le JOUR DE votre examen :

- **2 à 3 HEURES avant votre examen** commencez à boire le 1L de solution restante, 1 verre (250mL/8oz) toutes les 10 minutes jusqu'à ce qu'il n'en reste plus.
- Ne buvez pas de liquides foncés, pas de café.
- Cessez de boire des liquides clairs 1 heure avant votre examen.

AVIS IMPORTANT

- Selon les recommandations du Cardiologue ou du médecin : **abstenez-vous de prendre du Coumadin, Plavix, or Xarelto ou des médicaments pour éclaircir le sang ,et tous suppléments de fer .**
- **DEUX (2) JOURS AVANT CESSEZ DE MANGER NOIX OU GRAINS**
- **Il est obligatoire que vous soyez accompagné par quelqu'un qui vous conduira à la maison. Vous n'êtes pas autorisé à conduire pour un minimum de 24 heures après votre examen.**

Frais d'annulation de \$500.00 non remboursables. Veuillez consulter la politique d'annulation.