

PRÉPARATION POUR LA COLOSCOPIE

Votre côlon doit être complètement vide afin d'assurer le succès de l'examen.

GOLYTELY ou COLYTE

Vous devez vous procurer le produit suivant à la pharmacie de votre choix :

- 1 bouteille de **Golytely ou Colyte (4L)**.
- 3 comprimés de **BISACODYL**

Le JOUR AVANT votre examen :

- **Buvez SEULEMENT des liquides clairs toute la journée. Prenez un verre de liquides clair (8 oz) à chaque heure.**
- (Gatorade, eau, jus, boissons gazeuses, bouillon, popsicles, thé sans ajout, café noir, Jello jaune/vert/orange sans fruits ou garnitures ajoutées).
- **Ne prenez pas aucun aliment solide.**
- **Pas de liquide de couleur foncé/rouge, pas de jus avec pulpe et aucun produit laitier.**
- **Préparer la solution et la garder au frigo jusqu'à son utilisation.**
- **A 12 :00** : prendre **3 comprimés de Bisacodyl** avec 1 verre d'eau (250ml/ 8 oz)
- **À 15h00** commencez **à boire 3L de solution**, 1 verre (250mL/8oz) toutes les 10 minutes jusqu'à ce qu'il n'en reste plus ;
- Si vous vous sentez trop ballonné, attendez de passer une selle puis continuez à boire.

Le JOUR DE votre examen :

- **2 à 3 heures avant votre examen : à boire le 1L de solution** restante, 1 verre (250mL/8oz) toutes les 10 minutes jusqu'à ce qu'il n'en reste plus.
- Ne buvez pas de liquides foncés, pas de café.
- Cessez de boire des liquides clairs 1 heure avant votre examen.

AVIS IMPORTANT

- **Selon les recommandations du Cardiologue ou du médecin : Abstenez-vous de prendre du Coumadin, Plavix, Xarelto ou des médicaments pour éclaircir le sang ,et tous suppléments de fer .**
- **DEUX (2) JOURS AVANT CESSEZ DE MANGER NOIX OU GRAINS**
- **Il est obligatoire que vous soyez accompagné par quelqu'un qui vous conduira à la maison. Vous n'êtes pas autorisé à conduire pour un minimum de 24 heures après votre examen.**

Frais d'annulation de \$500.00 non remboursables. Veuillez consulter la politique d'annulation.